

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДТП

## Опасное наружное кровотечение

Размер лужи крови в диаметре превышает метр.

Быстро пережать кровоточащий сосуд выше раны и проставить окружающим найти кровоостанавливающий жгут. Вызвать скорую помощь.

Пережать артерию рукой и наложить жгут.


### Как остановить обильное кровотечение из раны бедра?

Благоприятный исход зависит от своевременного оказания помощи. При ранении бедренной артерии бездействие в течение 2-3 мин обязательно приведет к смерти пострадавшего от потери крови.

Принять бедренную артерию кулаком чуть ниже паховой складки.

Наложить жгут на бедро (через гладкий твердый предмет, например, головку бита) и убедиться, что у лодыжки исчез пульс. Вложить записку с указанием времени.

Нельзя наложить жгут на бедренную артерию без помощи второго спасателя, который должен прижать ногу. При отсутствии помощника не следует терять время на попытку наложить жгут самостоятельно.



Если не смотря на сильное давление кулаком на бедренную артерию, продолжается кровотечение из раны – продолжать давить кулаком на бедро с максимальным усилием и ждать, пока кровотечение полностью не остановится. Ни в коем случае нельзя прерывать свои действия.

### Что делать в случаях ампутации пальцев кисти?

При ампутации всех пальцев кисти кровотечение не угрожает жизни. Такая травма сопровождается сильнейшей болью и эмоциональным потрясением.

При оказании помощи не следует забывать о необходимости обезболивания таких пострадавших, а так же о том, что при соблюдении определенных условий возможна реплантация ампутированных пальцев в течение суток.



Наложить давящую повязку до локтевого сустава.

Усадить пострадавшего и приподнять руку вверх. Приложить к ране тампон из большого количества бинта или марли.

С целью возможной реплантации ампутированные пальцы следует положить в целлофановый пакетик, который надо опустить в другую, наполненный холодной водой или льдом.



Зафиксировать руку на косынке.



### Что делать в случаях сильного кровотечения из ран плеча, предплечья и ладони?

Большинство людей при виде крови теряет сознание. Поэтому пострадавшего необходимо усадить или уложить. В таком положении будет легко выполнить одно из важнейших правил остановки кровотечения из ран верхней конечности, рана должна оказаться выше уровня груди пострадавшего.

Усадить пострадавшего и приподнять руку на плечо. Зафиксировать руку косынкой. Прижать плечевую артерию к плечевой кости выше раны.



Наложить жгут на подмышечной впадине и убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии.



Наложить на рану стерильную повязку. Вложить записку о времени наложения жгута и еще раз проконтролировать пульс.



Зафиксировать руку косынкой.



Если прибытие медицинского персонала ожидается в течение нескольких часов: – через каждые 30 мин следует снимать жгут; – дожидаться, пока единично стекающие капли не превратятся в поток крови и парализует явля ниже наложения жгута (потребуется более 10-15 с) и снова наложить жгут. Так можно поступать в течение нескольких часов.

В случаях травматической ампутации кисти следует обязательно наложить кровоостанавливающий жгут.